



**XXVIII CONGRESO COLOMBIANO DE
DERMATOLOGIA
XVI REUNION INTERNACIONAL DE
TERAPEUTICA
XIV ENCUENTRO COLOMBO VENEZOLANO**

LA PIEL NOS UNE

Dr. Antonio Rondón Lugo


Profesor Emeritus Instituto de Biomedicina
Coordinador Comité de Bioética
Instituto de Biomedicina (UCV)

rondonlugo@yahoo.com

www.antoniorondonlugo.com

Caracas - Venezuela

Paciente de 8 años , con diagnóstico de Leishmaniasis cutánea localizada (inmunocompetente) quien tenía leishmanina de 22 mm e histopatológicamente compatible para leishmaniasis, parásitos ++ Se trató con Glucantime 3 series, asintomática por tres años y acude por presentar lesión alrededor de la cicatriz






Diagnóstico ?


- ✓ Psoriasis
- ✓ Líquen Plano
- ✓ Sarcoidosis
- ✓ Leishmaniasis
- ✓ Cromomicosis
- ✓ Tuberculosis cutánea

Que Haría Ud.?


- Leishmanina
- Examen directo y Cultivo micológico
- Cultivo para micobacterias
- Leishmanina
- Biopsia



Corte histológico con hematoxilina y eosina a 4x:
Muestra epitelio con acantosis irregular (flecha roja).
La dermis se observa completamente ocupada por
denso infiltrado nodular y difuso de aspecto
granulomatoso.



A mayor aumento inflamatorio se aprecia infiltrado inflamatorio denso, constituido por granulomas (flecha blanca) rodeados de linfocitos y plasmocitos.





En este aumento se pueden apreciar numerosas amastigotas de leishmanias (flechas) dentro de histiocitos y sueltas en la dermis.


Diagnóstico Definitivo

Leishmaniasis
Cutánea
Intermedia









Halmai O., Arosemena R., Paez E., Weiss E., Rondón Lugo AJ.
“American Cutaneous Leishmaniasis Intermediate Form”. Int. J.
of Dermat. 1993, 32:204-5



Rondón Lugo AJ., Convit J.

“Spectrum of American Cutaneous
Leishmanisis”. Dermatology in five
Continents Springler Verlag. Berlin
1988; 789-792

*Halmai O., Arosemena R., Paez E.,
Weiss E., Rondón Lugo AJ.*

“American Cutaneous Leishmanisis
Intermediate Form”. Int. J. of
Dermat. 1993, 32:204-5

*Convit J., Ulrich M., Tapia FJ., Castes
M., Rondón Lugo AJ.*

“The Clinical and Immunological Spectrum of American Cutaneous Leishmaniasis”. Trans. Roy. Soc. Trop. Medic. 1993. 87: 444-8

Intermediate or chronic cutaneous leishmaniasis: leukocyte immunophenotypes and cytokine characterisation of the lesion

Diaz NL, Zerpa O, Ponce LV, Convit J, Rondon AJ, Tapia FJ.
Intermediate or chronic cutaneous leishmaniasis: leukocyte immunophenotypes and cytokine characterisation of the lesion.
Exp Dermatol 2002; 11: 34–41. © Munksgaard, 2002

Abstract: The American cutaneous forms of leishmaniasis include immune-responder individuals with localised cutaneous leishmaniasis (LCL) and non-responder individuals with diffuse cutaneous leishmaniasis (DCL). Patients with intermediate or chronic cutaneous leishmaniasis (ICL) have increased morbidity due to the length of their illness, atypical forms and areas of compromise. In the present study, we evaluated the expression of the leukocyte antigens (CD4, CD8, CLA:

**N. L. Diaz, O. Zerpa, L. V. Ponce,
J. Convit, A. J. Rondon and
E. J. Tapia**

Instituto de Biomedicina, Universidad Central de Venezuela, Apartado 4043, Caracas 1010A, Venezuela.

■ Luciano Mavilia; Riccardo Rossi, Daniela Massi et al. University of Florence, Italy.

Leishamniasis Recidiva Cutis:

an unusual two steps recurrence

Int. J. Dermatology 2002, 41: 506-7



IGLESIA DE CLARINES



Gracias